

Evolución del tratamiento:



Tras el estudio diagnóstico clínico y radiográfico, se procede a la colocación del implante en la zona del primer premolar superior izquierdo siguiendo el protocolo quirúrgico recomendado. El proceso cicatricial al tercer, sexto y noveno día muestran una correcta estabilidad de los tejidos, favoreciendo el proceso de osteointegración del implante.

CASO CLÍNICO REALIZADO POR:

Dr. Oscar Gómez Miñarro y Dra. Ana M^a González Sánchez.

Máster en Periodoncia y Implantología Oral, Facultad de Odontología, Universidad de Barcelona

PERIO-AID[®]
GEL BIOADHESIVO



USO TÓPICO
POST CIRUGÍA

CLORHEXIDINA 0,20%
con Ácido hialurónico

0,20

► CLORHEXIDINA 0,20%

Es el antiséptico más eficaz, considerado el *gold standard*, por su acción bactericida de amplio espectro. Su acción principal es evitar el desarrollo del biofilm oral.

► ÁCIDO HIALURÓNICO 0,20%

Componente presente de forma natural en los tejidos de la mucosa oral, favorece la proliferación y migración de los fibroblastos y células epiteliales, forma una capa protectora, ayuda a regenerar los tejidos dañados y acelera el proceso de reparación de los mismos.

► PANTENOL 5%

Favorece la disminución de la inflamación gingival en la zona afectada y estimula también la regeneración de los tejidos, ayudando a su recuperación.

DENTAID
technology
hyaluronrepair

ACCIONES

CHX
0,20%

ACCIÓN ANTISÉPTICA



ACCIÓN REGENERADORA



ACCIÓN REPARADORA/
CICATRIZANTE



ACCIÓN ANTIINFLAMATORIA



ACCIÓN BIOADHESIVA

DENTAID

Oral health. Better life.

Evolución de la cicatrización en el tratamiento de colocación de Implante Dental


Datos del paciente:

Edad: 62 años **Sexo:** Hombre

Antecedentes: Sin antecedentes de interés

Patologías asociadas: sin

SITUACIÓN BASAL: el paciente presenta zona edéntula en localización del primer premolar superior izquierdo.



Zona edéntula en 2.4 por fisura radicular. La exodoncia se llevó a cabo 5 años atrás.



Presencia de colapso de los tejidos blandos/duros.

Tratamiento:

- Método utilizado: cirugía de colocación de implante.
- Tipo de instrumental usado: instrumental quirúrgico de colocación de implante, sutura 5/0 no reabsorbible.
- Tratamiento coadyuvantes: Perio Aid gel bioadhesivo durante 10 días (mañana/noche)
- Antes de cada intervención durante todo el proceso, se realiza pre enjuague con 15ml de colutorio Perio-Aid (clorhexidina 0,12%+CPC), con el fin de tener una mejor asepsia

El proceso de cicatrización se ha producido de manera adecuada, observándose una correcta adaptación de los tejidos gingivales tras la inserción del implante.

La cirugía de colocación de implante favorecerá la reposición del diente ausente, mejorando la estabilidad oclusal y estética del paciente.



Zona de colocación del implante en localización del primer premolar superior izquierdo.