

Evolución del tratamiento:



Tras el estudio diagnóstico clínico y radiográfico, se procede a la exposición quirúrgica del canino derecho inferior incluido.

El proceso cicatricial al tercer, sexto y noveno día muestran una adecuada adaptación de la mucosa, favoreciendo la colocación de soporte y aparatología ortodóncica que facilitarán la reposición final del canino.

CASO CLÍNICO REALIZADO POR:

Dr. Oscar Gómez Miñarro y Dra. Ana Mª González Sánchez.

Máster en Periodoncia y Implantología Oral, Facultad de Odontología, Universidad de Barcelona

PERIO·AID®
GEL BIOADHESIVO



CLORHEXIDINA 0,20%
con Ácido hialurónico

0,20

► CLORHEXIDINA 0,20%

Es el antiséptico más eficaz, considerado el *gold standard*, por su acción bactericida de amplio espectro. Su acción principal es evitar el desarrollo del biofilm oral.

► ÁCIDO HIALURÓNICO 0,20%

Componente presente de forma natural en los tejidos de la mucosa oral, favorece la proliferación y migración de los fibroblastos y células epiteliales, forma una capa protectora, ayuda a regenerar los tejidos dañados y acelera el proceso de reparación de los mismos.

► PANTENOL 5%

Favorece la disminución de la inflamación gingival en la zona afectada y estimula también la regeneración de los tejidos, ayudando a su recuperación.



USO TÓPICO
POST CIRUGÍA



DENTAID
technology
hyaluronrepair

ACCIONES

CHX
0,20%

ACCIÓN ANTISÉPTICA



ACCIÓN REGENERADORA



ACCIÓN REPARADORA/
CICATRIZANTE



ACCIÓN ANTIINFLAMATORIA



ACCIÓN BIOADHESIVA

DENTAID

Oral health. Better life.

Evolución de la cicatrización en el tratamiento de ortodoncia con cirugía de canino inferior

Datos del paciente:

Edad: 10 años **Sexo:** hombre

Antecedentes: sin antecedentes de interés

Patologías asociadas: sin

SITUACIÓN BASAL: el paciente presenta canino derecho inferior incluido con presencia de diente deciduo en la arcada.



Maloclusión, apiñamiento y canino derecho mandibular incluido con proyección bucal



Presencia de canino deciduo derecho mandibular

Tratamiento:

- Método utilizado: cirugía de exposición para la colocación de botón para su posterior tracción ortodónica.
- Tipo de instrumental usado: instrumental quirúrgico de microcirugía periodontal, sutura 6/0 reabsorbible
- Tratamiento coadyuvantes Perio-Aid gel bioadhesivo durante 10 días (mañana/noche)
- Antes de cada intervención durante todo el proceso, se realiza pre enjuague con 15ml de colutorio Perio-Aid (clorhexidina 0,12%+CPC), con el fin de tener una mejor asepsia

El proceso cicatricial transcurre sin complicaciones, observándose una correcta adaptación de los tejidos mucosos.

La cirugía de exposición de canino incluido favorecerá la reposición del canino en la arcada, mejorando la estabilidad oclusal, periodontal y estética del paciente.



Soporte para la tracción de canino incluido previo a la colocación de microtornillo y aparatología ortodónica